

<b>Parametri da valutare</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>Non so/ Non valutabile</b>
1. C'è stato un miglioramento del sintomo principale o della condizione per la quale è stata prescritta la medicina omeopatica?	+2	-1	0
2. Il miglioramento clinico si è verificato in un periodo di tempo coerente rispetto all'assunzione del rimedio o dei rimedi?	+1	-2	0
3. C'è stato un iniziale aggravamento omeopatico dei sintomi?	+1	0	0
4. La modificazione del quadro clinico ha riguardato più del sintomo o della condizione principale (cioè, altri sintomi alla fine sono stati migliorati o modificati)?	+1	0	0
5. Lo stato generale + migliorato? (si suggerisce di utilizzare scale validate)	+1	0	0
6A <i>La direzione della cura:</i> alcuni sintomi sono migliorati nell'ordine temporale opposto alla loro comparsa?	+1	0	0
6B <i>La direzione della cura:</i> almeno due dei seguenti aspetti si sono verificati rispetto all'ordine di miglioramento dei sintomi: - dagli organi di maggiore importanza a quelli di minore importanza? - dagli aspetti più profondi a quelli più superficiali dell'individuo? - dall'alto verso il basso?	+1	0	0
7. I "vecchi sintomi" (definiti come sintomi non stagionali e non ciclici che in precedenza si pensava si fossero risolti) sono riapparsi temporaneamente durante il corso del miglioramento?	+1	0	0
8. Ci sono cause alternative (diverse dal rimedio) che, con un'alta probabilità, potrebbero aver causato il miglioramento? (Considerare il decorso noto della malattia, altre forme di trattamento e altri interventi clinicamente rilevanti)	-3	+1	0
9. Il miglioramento della salute è stato confermato da prove oggettive? (per esempio, test di laboratorio, osservazione clinica, ecc.)	+2	0	0
10. La ripetizione della dose, se effettuata, ha portato a un miglioramento clinico simile?	+1	0	0